

## BRIEF VAN RENÉ PLETINCK.

---

Aan E.H. Jozef Heynderycx voor Atalanta.

Betreft “*Cynegetis impunctata*, *Coccinellidae*” Nieuwe soort voor België?

Op 26-4-1999 vond ik voor mij 2 onbekende kevertjes in paarhouding op het water. Mijn eerste gedacht was dat het twee haantjes waren (*Sphaeroderma testaceum* F.) een *Chrysomelidae* die hier vaak voorkomt in de Durmemeersen. Thuis gekomen en onder de bino gekeken zag ik dat de kevertjes behaard waren, dus geen haantjes. Met het determineerboek van Paul Kuhnt “Käfer Deutschland” kwam ik tot de familie van de lieveheersbeestjes en tot de soort *Cynegetis impunctata* of ongevekt lieveheersbeestje. Op 27-4-1999 vond ik met slepen door ‘t gras nog enkele exemplaren. Naar mijn weten staat dit kevertje niet vermeld in de lijst van de Belgische lieveheersbeestjes. In het verleden moeten er twijfelgevallen geweest zijn met *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* L, vooral met de ongevekte soort. Er zijn heel duidelijke verschillen tussen beide soorten. Beide kevers behoren tot de *Epilachninae* of plantenetende soorten. *Cynegetis* komt van het Grieks en betekent “Jager op bladluizen” en *impunctata* betekent “ongestippeld” dus zonder zwarte vlekjes. De geslachtsnaam is dus verwarrend.

Hieronder de voornaamste kenmerken:

<i>Cynegetis impunctata</i> L.	<i>Subcoccinella(=Lasia) vigintiquatuorpunctata</i> L
Midden- en Oost Europese soort van vochtige graslanden.	Midden- en Oost Europese soort van droge graslanden
Zwarte kop, gele dekschilden en halsschild	Rode kop, geel-rode dekschilden en halsschild
Eerste sprietlid donker	Eerste sprietlid rood
Vliesvleugels verschrompeld	Vliesvleugels goed ontwikkeld
Voorste schenen duidelijk verbreed	Voorste schenen matig verbreed
Ongevekt	Kan ongevekt zijn, meest met 24 donkere vlekjes op de dekschilden (kan volledig zwart zijn)
Uitsparing in epipleuren voor dijen van midden- en achterpoten	Geen uitsparing in epipleuren
Klauwtjes met kleine basale tand	Klauwtjes gespleten, gevorkt
Puntering op dekschilden met grotere punten tussenin verspreid	Puntering egaal en fijn
Schouders merkbaar	Dekschilden afgerond
Bij bovenaanzicht ziet men de zijranden van	Bij bovenaanzicht ziet men de zijranden van

de dekschilden niet, kever is boller

de dekschilden, kever minder bol

Soms beschrijft men de kleur als volgt : matbruin, bruinrood of bruingeel, okerkleurig, geelrood.

Geraadpleegde werken :

Faune de France, Rey Perrier blz. 161 nr. 391

De Nederlandse Lieveheersbeestjes KNNV. Nr. 125 blz. 39 nr. 2 bij opmerking

Thieme's kevergids K.W. Harde/ F. Severa blz. 1884 nr. 2

Veldterminatietabel voor de Lieveheersbeestjes van België. Jeugdbond voor natuurstudie. J.Y. Bagnée, E. Branquart, D. Maes blz. 28 nr. 21, blz. 35 nr. 49

Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschland, Paul Kuhnt blz. 565 nr. 3, blz. 569 nr. 3



*Cynegetis impunctata*

Mededeling : op 5-8-2003 vond ik door te slepen op de heide te Waasmunster voor de eerste keer *Hispella atra* L. of zwart stekelhaantje. De larven mineren verschillende grassoorten.

Vriendelijke groetjes.

René.