

DIPTERA IN ONZE HUIZEN.

In onze huizen kunnen we 9 dipteren families aantreffen, sommige van den kunnen we daar doorheen gans het jaar tegenkomen. Het zijn vertegenwoordigers van de families *Lycoriidae*, *Fungivoridae*, *Phoridae*, *Culicidae*, *Sphaeroceridae*, *Drosophilidae*, *Muscidae*, *Calliphoridae* en *Larvaevoridae*. In alle seizoenen kunnen we in onze huizen ontmoeten *Neosciara fenetralis* Zett., *Culex pipiens* L., *Theobaldia annulata* Schr., *Megasilia rufipes* Meig., *Drosophila funbris* F., *Fannia canicularis* F., *Fannia scalaris* F., *Stomoxis calcitrans* L., *Musca domestica* L., *Muscina stabulans* Fall., *Musca carvina* F., *Dasyphora cyanella* Mc., *Protophormia terra novae* R.D., *Calliphora erythrocephala* Mc., en *Pollenia rudis* F. De larven van deze soorten zijn bijna allemaal saprophagen, coprophagen of sarcophagen (vleesvliegen). Sommige dipteren komen soms in zwermen de huizen binnen bvb. in 1946 en 1947 gedurende de ganse zomer grote zwermen van *Musca domestica* L., *Fannia canicularis* L. en *Fannia scalaris* F. terwijl er in 1948 zeer weinig vliegen waren. Soorten die slechts in de winter in huis gevonden worden als overwinteraars zijn *Musca corvina* F. en *Pollenia rudis* die soms in zwermen overwinteren, met de andere dipteren soorten is dit zelden of nooit het geval.