

## HET GENUS PYRGUS HÜBNER 1819

---

Hoewel veel soorten ervan goed bekend zijn is de vraag naar informatie over dit genus toch opvallend. We starten daarom nu een checklist van de species van het genus *Pyrgus* en zullen dat ook betrachten voor de andere genera en species van de Hesperidae. Het genus *Pyrgus* is Holarctisch, dus Eurosiberisch, Oost-palearctisch, Centraal Aziatisch en tot west Europa en eveneens verspreid tot in Noord-Amerika maar van hieruit hebben zich ook enkele soorten verspreid doorheen gans Zuid-Amerika, tot Patagonië terwijl andere soorten niet verder geraakt zijn dan Colorado, N. Mexico en Arizona. Het is dus een oorspronkelijk Holarctisch genus met een secundaire verspreiding in het Neo-subtropisch en Neotropisch gebied, van midden en zuid Amerika.

<i>P. carthami</i> HÜBNER 1813	Z. Europa, C. Europa, Klein Azië, C. Azië Larve op <i>Potentilla pedata</i> , <i>P. neumanniana</i> , <i>P. argentea</i> , <i>Malva sylvestris</i> , <i>Althaea officinalis</i> , <i>A. hirsuta</i> , <i>Centaurea</i> .
<i>P. sidae</i> ESPER 1784	Z.O. Europa, Italië, Balkan, Klein Azië, Iran, Afghanistan. Larve op <i>Malvaceae</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Potentilla pedata</i> .
<i>P. andromedae</i> WALLENGR. 1853	Oost-Europa Larve op <i>Alchemilla glomerulans</i> (in Zweden), <i>Malva</i> .
<i>P. alpinus</i> ERSCHOFF 1874	Ghissar, W. China, N. India.
<i>P. aplinus</i>	China, E; Pamirs
<i>P. darwazicus</i> GRUM-GRSHIMAILO 1890	Ghissar, Altai, Darvaz, W. Pamir
<i>P. cashmirensis</i> MOORE 1874	Tadjikistan, N.O. Afghanistan, N. Pakistan, N. India.
<i>P. cacaliae</i> RAMBUR 1839	Alpen, Bulgarije, Carpathen, Pyreneeën. Larve op <i>Tussilago farfara</i>
<i>P. centaureae</i> RAMBUR 1839	N. Scandinavië, Siberië, Altaï Larve op <i>Rubus chamaemorus</i>
<i>P. sibirica</i> REVERDIN 1911	Altai, Sayan.
<i>P. maculatus</i> BREMER & GREY 1853	Z; Siberië (Altai, Ussuri), Japan. Larve op <i>Spiraea ussurensis</i> , <i>S. media</i> , <i>Potentilla freyiana</i>
<i>P. malvae</i> LINNAEUS 1758	Europa, Klein Azië, Amur, Mongolië, Japan Larve op <i>Rosaceae</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Potentilla anserina</i> , <i>P. palustris</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>R. saxatilis</i> .
<i>P. malvoides</i> ELWES & EDWARDS 1898	Zuid en oost Europa Larve op <i>Potentilla</i> , <i>Fragaria</i> , <i>Malva</i> , <i>Agrimonia</i> .
<i>P. melotis</i> DUPONCHEL 1834	Kaukasus, Transkaukasië, Klein Azië, Griekenland, Midden Oosten. Larve op <i>Rubus</i>
<i>P. serratulae</i> RAMBUR 1839	Zuid en Oost Europa, Klein Azië, Iran, Libanon, Z. Siberië, Mongolië, NO. China Larve op <i>Potentilla</i> , <i>Alchemilla</i>
<i>P. onopordi</i> RAMBUR 1839	ZW Europa, N. Afrika
<i>P. carlinae</i> RAMBUR 1839	Alpen

<i>P. cirsii</i> RAMBUR 1839	Larve op <i>Potentilla verna</i> WO Europa.
<i>P. cinarae</i> RAMBUR 1839	Larve op <i>Potentilla verna</i> ZO Europa, Z. Rusland, Z. Balkan, Turkestan
<i>P. armoricus</i> OBERTHÜR 1910	Marokko, Algerije, CO Europa, ZO Europa, Klein Azië, Iran, Libanon. Larve op <i>Fragaria vesca</i> , <i>Potentilla gelida</i> , <i>Potentilla pedata</i> , <i>Potentilla reptans</i>
<i>P. alveus</i> HÜBNER 1803	N. Afrika, Europa, Kaukasus, Altai, Siberië Larve op (in Zweden) <i>Agrimonia</i> , <i>Polygala</i> , <i>Potentilla</i>
<i>P. speyeri</i> STAUDINGER 1887	Sayan, Amur, Ussuri
<i>P. jupei</i> ALBERTI 1967	Kaukasus, Turkije, N. Iran
<i>P. bellieri</i> OBERTHÜR 1910	ZWO Europa.
<i>P. ruralis</i> BOIDUVAL 1852	N. Amerika Larve op <i>Horkelia</i> , <i>Potentilla</i>
<i>P. xanthus</i> EDWARDS 1878	Z. Colorado, N. Mexico, Arizona
<i>P. scriptura</i> BOIDUVAL 1852	N. Amerika Larve op <i>Sida hederacea</i> , <i>Sphaeralcea coccinea</i>
<i>P. communis</i> GROTE 1872	N. Amerika, Canada, C. Amerika, Z. Amerika Larve op <i>Malvaceae</i>
<i>P. albescens</i> PLÖTZ 1884	Z. California, Texas Larve op <i>Malvaceae</i> .
<i>P. oileus</i> LINNAEUS 1767	N. Amerika, C. Amerika, Z. Aamerika Larve op <i>Sida</i> , <i>Malva</i> , <i>Abutilon</i> , <i>Althaea</i>
<i>P. philetas</i> EDWARDS 1881	Z. New Mexico, Arizona, Texas, California, Mexico
<i>P. adepta</i> PLÖTZ 1884	
<i>P. bieti</i> OBERTHÜR 1886	
<i>P. americanus</i> BLANCHARD 1852	
<i>P. fides</i> EVANS 1942	
<i>P. bocchoris</i> HEWITSON 1874	